

ICS 65.020.30
B43
备案号：20994-2007

DB46

海南省地方标准

DB46/T 88—2007

五指山猪养殖技术规程

2007-06-01 发布

2007-08-01 实施

海南省质量技术监督局 发布

前 言

五指山猪是我国著名珍稀地方猪种，原产于海南省五指山地区，是当地群众饲养的一种小型猪。1986年被收录到《中国猪品种志》，2000年被农业部确定为国家级畜禽品种资源保护品种。

为了规范五指山猪饲养技术，充分发挥其优良性能，促进五指山猪养殖业的发展，特制定本规程。本标准由海南省农业厅提出。

本标准由五指山市畜牧局、海南省农业科学院畜牧兽医研究所共同起草。

本标准主要起草人：林哲敏、叶保国、王峰、邢福字、符育山。

五指山猪养殖技术规程

1 范围

本规程规定了五指山猪公猪、母猪、仔猪及生长育肥猪的饲养管理技术要求。
本规程适用于五指山猪的饲养管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

NY 5031 无公害食品 生猪饲养兽医防疫准则
NY 5032 无公害食品 畜禽饲料和饲料添加剂使用准则
NY/T 5033 无公害食品 生猪饲养管理准则
中华人民共和国动物防疫法

3 饲养管理

3.1 公猪的饲养管理

3.1.1 种公猪要求做到营养充足、运动适量和利用合理，使种公猪经常保持正常的体况，不过肥，也不过瘦。

3.1.2 公猪日喂 2 次，投喂精料量 1-1.5 千克。种公猪不宜长期给予高能饲料，否则易降低性能。后备公猪在生长期不能长期给予高蛋白饲料，否则易发生脚软而影响配种。

3.1.3 公猪单圈饲养，圈栏面积 6—8 米²，运动场面积 10—20 平方米，圈栏高 1.3 米。

3.1.4 公猪使用要合理，青年公猪每周使用 2—3 次，成年公猪每周 3—5 次。一般后备公猪初配年龄为 8 月龄，体重 20 千克左右为宜。

3.2 母猪的饲养管理

3.2.1 后备空怀母猪

3.2.1.1 选留符合本品种特征、生长发育、生产性能优良、健康的母猪作为后备猪。

3.2.1.2 后备母猪日喂 2 次，投喂精料量 0.8-1.2 千克，应保持适度膘情。

3.2.1.3 后备母猪初配年龄为 7 月龄，体重 15 千克左右为宜。

3.2.1.4 刚断奶的母猪用 1%—2%敌百虫溶液喷洒猪体，驱除体外寄生虫。

3.2.1.5 母猪断奶后一周左右开始发情，按配种计划适时配种，做好配种记录和登记。配种后 18—24 天，38—44 天检查母猪是否受孕，对未受孕母猪重新配种。母猪配种前半小时不喂料。

3.2.1.6 空怀母猪日喂 2 次，投喂精料量 0.8-1.2 千克。补饲一定量的青饲料。体弱或过肥母猪，应在技术人员指导下增减饲料量。

3.2.2 妊娠母猪

3.2.2.1 妊娠母猪日喂 2 次，妊娠 20 日以内喂量 0.8-1.2 千克/日，21-80 日为 1-1.4 千克/日，81-110 日为 1.4-1.6 千克/日。

3.2.2.2 五指山猪野性较大，应减少应激，防止咬架或挤压，不要驱赶和鞭打，以免机械性损伤引起流产或死胎，注意保持正常繁殖体况。

3.2.3 分娩哺乳母猪

3.2.3.1 在转猪前后，应用消毒液彻底消毒空分娩栏。母猪分娩前一周，在赶入分娩栏前，先洗净猪体，用消毒液或 1%敌百虫喷洒猪体，经消毒后赶入分娩栏，并做好登记。

3.2.3.2 至分娩前 2 天，日喂料 1-1.5 千克，分娩前 1—2 天减料，当天不喂料；分娩后第一天投喂量 0.5 千克，第二天 1 千克，第三天 1.5 千克，以后按产仔多少增减。

3.2.3.3 检查母猪乳房红肿、坚硬、发热与否，如有应立即治疗。检查阴道有无异常排泄物和肿胀，如有，应立即治疗。必要时需进行人工清理。准备好钳、抹布、碘酒、剪刀、秤、保温灯等接生工作用具。

3.2.3.4 母猪产后应注射产后康等预防阴道炎和子宫炎。母猪缺乳，可注射小剂量催产素刺激泌乳。

3.2.3.5 母猪一般采用小群饲养，每圈 4—5 头，圈栏面积 8—10 米²，运动场面积 10—20 平方米，圈栏高 1.2 米。

3.3 仔猪的饲养管理

3.3.1 哺乳仔猪

3.3.1.1 仔猪产出后，立即用消毒过的抹布将口鼻内和全身粘液擦干。断脐应离腹部 3—5cm，断脐后用碘酒消毒，如流血不止，用缝线扎紧止血。

3.3.1.2 假死仔猪要及时抢救，迅速清除仔猪口、鼻内的粘液，进行人工呼吸或提起仔猪的后肢，用手拍打背部，促使其呼吸。

3.3.1.3 早喂初乳，固定奶头。仔猪产出后 1—2 小时喂初乳，全部产出后固定奶头，个体大的吸后面奶头，个体小的吸前面奶头。

3.3.1.4 保温：仔猪初生时护仔栏温度为 35℃，以后调整灯泡高度或度数，每天下降 0.5—1℃，一周后控制在 32℃。

3.3.1.5 仔猪产出后 2—3 日龄注射铁钴合剂或牲血素补铁，一般一次性注射 150-200 毫克铁。

3.3.1.6 仔猪产出后 7 日开始诱教补喂乳猪料。10—20 日龄时，对非种用小公猪去势。

3.3.1.7 仔猪 35 日龄断奶，断奶仔猪转入保育舍饲养，逐渐转喂断奶仔猪料，采取自由采食。

3.3.2 断奶仔猪的饲养管理

3.3.2.1 仔猪断奶后维持在原栏饲养 5-7 天，使用原来的饲料，逐步进行饲料、饲养制度和环境过渡。

3.3.2.2 断奶第一周日喂料量以够吃到下次喂料前为度，少喂勤添。第 2、3 周日喂料次数逐步减至 2—3 次，投喂精料量 0.3-0.5 千克/天·头。特别是在第 2 周应注意控制料量，防止补偿性过食。

3.4 生长育肥猪的饲养管理

3.4.1 按体重大小、强弱、公母分栏饲养，每栏 15—20 头，每头占栏面积 0.5—0.8 米²。

3.4.2 定位调教猪采吃、睡觉和排便地点，使之建立起有益的条件反射。

3.4.3 喂料：自由采食，饲喂量随体重增加而增加，投喂精料量 0.5-1.2 千克/天·头。日喂 2—3 次，料型为湿料饲喂或干喂。

3.4.4 夏天做好防暑降温，冬天做好防寒保暖工作。夏天可采用遮阳、喷水降温，冬天可采用铺设垫草保暖。

3.4.5 生长猪 70 日龄肌注左旋咪唑驱除体内寄生虫。发生皮肤病时，用体外驱虫药驱虫。

3.5 饮水：

各生长阶段的猪都采用自由饮水，饮用水要保持清洁。

4 营养需要

根据猪不同生长时期的营养需要量配制不同的配合饲料。五指山猪营养需要参考值、参考饲料配方见表 1、表 2。

表 1 五指山猪营养需要参考值

指标 名称	粗蛋 白不 低于 (%)	消化能 不低于 (Mcal/kg)	粗脂肪 不低于 (%)	粗纤维 不高于 (%)	粗灰分 不高于 (%)	钙 (%)	有效磷 不低于 (%)	食盐 (%)
小猪 (41-90 日龄)	16	3.00	2.0	8.0	7.0	0.8—1.0	0.50	0.3—0.5
中猪 (91-150 日龄)	14	2.90	1.0	9.0	9.0	0.6—0.8	0.35	0.3—0.5
大猪 (151 日龄以上)	12	2.95	1.5	10.0	10.0	0.4—0.6	0.35	0.3—0.5

表 2 五指山猪参考饲料配方

单位：%

指标 名称	玉米	豆粕	鱼粉	木薯	米糠	麦麸	预混料
小猪 (41-90 日龄)	49	20	1	8	15	3	4
中猪 (91-150 日龄)	32	18	—	23	15	8	4
大猪 (151 日龄以上)	25	15	—	30	18	8	4

5 饲料及兽药使用

5.1 应用饲料及饲料添加剂必须遵守《饲料及饲料添加剂管理条例》。

5.2 兽药使用符合 NY5030—2001 的规定，严禁使用禁用兽药。

5.3 实行用药登记管理制度，建立用药档案。

6 卫生防疫

6.1 卫生防疫制度

6.1.1 猪场门口、生产区入口和猪舍入口处设置消毒池，消毒液每周更换 2 次。

6.1.2 生产区门口设更衣消毒室，工作人员进入生产区要消毒，更换工作服和胶鞋。

6.1.3 严禁非工作人员进入生产区，确需进入必须经严格消毒，更换隔离衣、胶鞋方可进入。

6.1.4 严禁从场外带入鲜活畜禽产品，严禁场内人员对外诊治病猪，严禁在场内饲养其他动物。

6.1.5 猪舍每天清扫一次，猪舍及用具每周消毒一次，场区环境每半月定期消毒一次。

6.1.6 进猪前，猪舍及用具必须严格清洁消毒，经检查合格后，空圈 7—15 天，方可进猪。

6.1.7 每月定期灭鼠、灭蝇。

6.2 免疫接种

根据本地区疫病流行情况和本场实际情况制订合理的免疫程序。

6.2.1 仔猪常规免疫计划（参考）：

日 龄	疫 苗	接 种 方 法
10	链球菌疫苗	肌肉注射
20	三联苗（猪瘟、丹毒、肺疫）	肌肉注射
30	猪口蹄疫疫苗	肌肉注射
50—60	猪瘟疫苗	肌肉注射

6.2.2 种猪每年春秋两季分别注射猪口蹄疫疫苗和猪三联苗（猪瘟、丹毒、肺疫）。
